

# CVP + R



Non-Hodgkin Lenfoma Tedavisi İin

Değerli hasta ve hasta yakınlarımız; bu kitapçıklar sizlere Hematoloji Uzmanlık Derneği tarafından hastalığınız sürecinde karşınıza çıkabilecek sorunların çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Hematoloji Uzmanlık Derneği , Hematoloji uzmanları tarafından kurulan ,kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu örgütüdür.

Derneğimizin temel amaçlarından birisi hematoloji alanında farkındalık yaratmak, bilgiyi tabana yaymaktır.

Bu amaçla derneğimiz gerek yazılı gerekse de görsel medyada Türkçe içerik yaratıp, hasta bilgilendirme toplantıları , destek gurupları kurup sizlere yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Derneğimiz tarafından hazırlanan **www.kanhastalıkları.net** adresinden değişik hematoloji hastalıkları ve bunların tedavileri konusunda geniş bilgilere ulaşabilir ,sorularınıza bir uzman tarafından yanıt bulabilirsiniz.

Kendilerine teşekkür ederiz.

**Hematoloji Uzmanlık Derneği**

## CVP + R kemoterapisi nasıl uygulanır ve olası yan etkileri nelerdir?

Size uygulanan kemoterapi CVP-R olarak adlandırılmaktadır. Çoğunlukla Non-Hodgkin Lenfoma tedavisi için ve ayrıca diğer hastalıkların tedavisi için kullanılmaktadır. CVP-R, dört ilaçtan oluşmaktadır:

- siklofosfamid
- vinkristin
- prednizon
- rituksimab

Siklofosfamid ve vinkristin, kanser hücrelerinin bölünmesi ve çoğalmasını önleyebilen ve sonuçta kanser hücrelerinin küçülmesine ve ölümüne neden olabilen kemoterapi ilaçlarıdır. Prednizon bir kortikosteroiddir. Rituksimab, kanser hücrelerini kemoterapi ilaçlarına kıyasla daha kesin bir şekilde hedefleyen ve monoklonal antikor adı verilen yeni bir ilaç tipidir.

### **Kemoterapiye Başlamadan Önce Bilmem Gerekenler Nelerdir?**

Doktorunuza, diyet takviyeleri ya da vitaminler, bitkisel ilaçlar ve homeopatik ilaçlar da dahil olmak üzere, kullanmakta olduğunuz tüm reçeteli ya da reçetesiz satılan ürünler konusunda bilgi verdiğinizden emin olunuz.

Tedaviniz sırasında etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız. Kemoterapi ilaçları fetusun zarar görmesine neden olabilir; bu nedenle, siz ya da eşiniz/partnerinizin gebe kalması halinde, bunu derhal doktorunuza bildirin.

Tedavi sırasında bebeđinizi emzirmekten kaınınız. Kemoterapi ilalarının anne stne geip gemediđi bilinmemektedir.

Bazı kemoterapi ilaları kısırlıđa neden olabilir. Gelecekte ocuk sahibi olmak istiyorsanız, seenekleriniz konusunda doktorunuzla konuşunuz. Bu ilacı kullanırken, doktorunuzun onayını almadan herhangi bir bađışıklama ya da aşı yaptırmayınız.

## **Bu Tedaviye Bařlamadan nce Bilmem Gerekenler Nelerdir?**

Siklofosfamid yara iyileşmesinin gecikmesine neden olabilir.

Siklofosfamid mesanede kanamaya neden olabilir. Bu yan etki riskini azaltmak için, fazladan sıvı tketimi ve mesanenin sık sık boşaltılması konusunda doktorunuzla konuşunuz. Ađrılı, sık ya da g idrara ıkma ya da idrarda kan grmeniz halinde, derhal doktorunuzu arayınız.

Vinkristin, kaza sonucu damar dıřına sızması halinde tahrişe neden olabilmektedir. Tedaviniz sırasında enjeksiyon yeri evresinde kızarıklık, ađrı, yanma ya da şişme olması durumunda, bunu derhal doktorunuza bildiriniz.

Vinkristin, bazı sinir hcrelerinizin dođru şekilde iřlev grmeyi durdurmasına neden olabilmektedir. Bu bozukluđa nropati adı verilir (bkz. “nemli Yan Etkiler Nelerdir?”). Bu sorun ođunlukla, tedavinin tamamlanmasından birkaç ay sonra yavaş yavaş dzelir. ok nadiren diđer sinirler de (boyun sinirleri gibi) etkilenebilir ve bu da, ene ađrısına ya da ift grmeye neden olabilir.

Vinkristin ile řiddetli kabızlık yaygın olarak grlmektedir (bkz. “nemli Yan Etkiler Nelerdir?”). Doktorunuz, kabızlıđı nlemek için bir laksatif ya da dıřkı yumuřatıcı kullanmanızı nerebilir.

Vinkristin vücuttaki ürik asit miktarını arttırabilmekte ve bu da, gut ya da böbrek taşlarına neden olabilmektedir. Bel ağrısı ya da yan ağrısı, ağrılı ya da güç idrara çıkma, eklem ağrısı veya el ya da ayak parmaklarında ağrı gelişmesi halinde, bunu doktorunuza bildiriniz.

Prednizon, midenin koruyucu tabakasını incelterek, mide asidinin neden olduğu tahrişe karşı daha duyarlı hale getirebilmektedir. Nadir olgularda, bu durum kanayan ülserlere yol açabilir. Hazımsızlık ya da başka herhangi bir mide sorunu yaşamamız halinde, bunu doktorunuza bildiriniz. Bu semptomların düzelmesine yardımcı olacak bir ilaç reçete edilebilir.

Prednizon, özellikle şeker hastalığınız varsa, kan şekeri düzeyinizin yükselmesine neden olabilir. Kan şekerinizi kontrol etmek için düzenli olarak kan ya da idrar testleri yaptırabilirsiniz. Fazla susuzluk hissediyor ya da normalden fazla idrara çıkıyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz. Prednizon kan basıncınızı arttırabilir. Baş ağrıları, görme bozuklukları, konfüzyon ya da uyuklama şikayetiniz varsa, hemen doktorunuza bildiriniz.

Prednizon enfeksiyon riskini arttırabilir ve ateş gibi, saptanması güç enfeksiyon belirtileri oluşturabilir. Herhangi bir enfeksiyon belirtisi gelişirse, bunu derhal doktorunuza bildiriniz (bkz. “Önemli Yan Etkiler Nelerdir?”).

Rituksimab, yaygın olarak hafif ila orta dereceli infüzyon reaksiyonuna neden olmaktadır. Olguların çoğunda reaksiyon, infüzyonun başlamasından 30 dakika ila iki saat sonra ortaya çıkarmakta ve tedavi tamamlandığında sona ermektedir.

Nadir olgularda, rituksimab ciddi, yaşamı tehdit edici bir reaksiyona neden olabilmektedir. Semptomlar ateş, üşüme, bulantı, güçsüzlük, baş ağrısı, deri döküntüsü, kaşıntı, dil ya da boğazın şişmesi, hışıltı, öksürük, nefes darlığı, akciğer konjesyonu, anormal kalp ritmi ve düşük kan basıncını içermektedir.

Bu semptomlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde, doktorunuza bu konuda bilgi veriniz.

İnfüzyon reaksiyonu olasılığı ilk infüzyonda en yüksek düzeydedir ve daha sonraki infüzyonlarla azalmaktadır. Doktorunuz, bir infüzyon reaksiyonu olasılığını azaltmak için tedaviden önce size asetaminofen (Tylenol) ve difenhidramin (Benadryl) önerebilir. Kan basıncı için ilaç kullanıyorsanız, size rituksimab infüzyonundan önce en az 12 saat süreyle ve infüzyon sırasında ilacınızı almayı bırakmanız tavsiye edilebilir.

Rituksimab, kemoterapi çok sayıda kanser hücrelerini hızlı bir biçimde öldürdüğünde ortaya çıkan tümör lizis sendromuna (TLS) neden olabilmektedir. Bu sendrom, böbrek yetersizliği, nöbetler, bulantı, kusma, mental bozulma, duygudurum değişiklikleri, kas krampları ve spazmları, eklem ağrısı ve düzensiz kalp atışına yol açabilen kan kimyası değişikliklerine neden olabilmektedir. Bu semptomlardan herhangi birinin gelişmesi halinde doktorunuzla iletişim kurunuz.

Rituksimab, hepatit B virüsünün yeniden aktif hale gelmesine neden olabilmektedir. Bu virüsün yeniden aktif hale gelmesi, aniden ciddi hepatit hastalığı ya da başka ciddi viral enfeksiyonların başlamasına yol açabilmektedir. Daha önce hepatit B geçirmiş olmanız halinde, doktorunuza bu konuda bilgi veriniz.

Rituksimab, kalp atışı düzensizliğine ve göğüs ağrısına neden olabilmektedir. Kalp hastalığı öyküsü olan hastalarda, tedavi sırasında sorun gelişme riski artmaktadır. Herhangi bir kalp sorununuz varsa, doktorunuza bu konuda bilgi veriniz.

Ritüksimab, nadir olgularda yaşamı tehdit edici olabilen bağırsak obstrüksiyonu ve perforasyonuna neden olabilmektedir. Özellikle tedavi kürünün erken döneminde karın ağrısı ortaya çıkması halinde, derhal doktorunuza bu konuda bilgi veriniz.

Ritüksimab, nadir olgularda yaşamı tehdit edici olabilen ciddi deri reaksiyonlarına neden olabilmektedir. Derinizde ağrılı yaralar, ülserler, kabarcıklar ya da soyulma gelişmesi halinde, derhal doktorunuza bu konuda bilgi veriniz.

Tedaviniz, aşağıdakileri içeren başka ilaçlarla etkileşime girebilmektedir:

- Fenitoin , fenobarbital ya da karbamazepin gibi nöbet tedavisi için kullanılan ilaçlar
- Ketokonazol, flukonazol ya da itrakonazol gibi mantar enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılan ilaçlar
- Simetidin
- Diltiazem, verapamil ya da nifedipin gibi kalsiyum kanal blokerleri
- Digoksin
- Aspirin, ibuprofen ya da naproksen gibi steroid olmayan anti-enflamatuvar ilaçlar
- Coumadin
- Rifampin ya da rifabutin gibi TB ve diğer enfeksiyonların tedavisi için kullanılan ilaçlar
- İnsülin de dahil olmak üzere, diyabet tedavisi için kullanılan ilaçlar
- Tiroid bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar
- Hidroklorotiazit ya da furosemid (Lasix) gibi diüretikler
- Yüksek kan basıncı tedavisi için kullanılan ilaçlar
- Siklofosfamid, vinkristin, prednizon, ritüksimab ya da bu ilaçların herhangi bir bileşenine karşı alerjiniz varsa, bu tedaviyi kullanmamalısınız.

## Bu Tedavi Nasıl Uygulanır?

Doktorunuz, tedavinizi bir damara enjeksiyon yoluyla uygulayacaktır. Size uygulanacak olan doz, kilonuz ve boyunuza dayanarak saptanacaktır. Doktorunuz, size uygulanacak olan tedavi sayısını belirleyecektir.

Tedaviniz uygulanmadan önce, bulantı ve kusmanın önlenmesine ve kontrolüne yardımcı olan ilaçlar alabilirsiniz. Bu ilaçlar, ağız yoluyla ya da bir damara enjeksiyon yoluyla uygulanabilir.

Prednizonu ağız yoluyla kullanacaksınız. Midedeki tahrişi en alt düzeye indirmek için, prednizonu besinlerle birlikte alınız ve alkolden kaçınınız. İlacınızı düzenli bir şemaya uygun olarak, günün aynı saatinde alınız. Bir dozu atlamanız halinde, hatırlar hatırlamaz prednizonu alınız ve ardından, bir sonraki dozu ne zaman alacağınız konusunda tavsiye almak için doktorunuzla iletişime geçiniz.

Prednizonu oda sıcaklığında, çocukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Çok fazla prednizon almanız halinde, derhal doktorunuzu, yerel zehir kontrol merkezini arayınız ya da acil servise başvurunuz.

## Önemli Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar yan etkilere neden olabilmekte, ancak her insan, her ilaca farklı reaksiyon vermektedir. Aşağıdaki tabloda, tedavinizle ortaya çıkabilen önemli yan etkiler, yan etkilerin ortaya çıkış sıklığı (yaygın, az yaygın ya da nadir), yan etkileri tanıma ve en düşük düzeye indirme yöntemleri ve olası tedavileri sıralanmaktadır. Yan etkilere ilişkin herhangi bir sorunuz ya da endişeniz olması halinde doktorunuzu arayınız.



Potansiyel Yan Etkiler	Yan Etkileri En Düşük Düzeye İndirme Yöntemi	Olası Tedaviler
<p><b>Kabızlık (Yaygın)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dışkı geçişinde güçlük</li> <li>• Normal bağırsak hareketi sıklığında azalma</li> <li>• Küçük, sert, kuru dışkı</li> <li>• Şişkinlik, gaz, kramplar ve ağrı</li> </ul> <p><b>Bulantı/Kusma (Yaygın)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Midede bulantı ya da rahatsızlık hissi</li> </ul> <p><b>Anoreksi ya da İştah Kaybı (Yaygın)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• İştahın olmaması</li> <li>• Yemeği fazlasıyla iğrenç bulma</li> <li>• Metalik ya da ilaca benzer tat</li> <li>• Bazı besinlerden hoşlanmamanın neden olduğu tat değişikliği</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bağırsaklarınızın yumuşamasına yardımcı olması için bol sıvı tüketiniz. Ağızınızda yara yoksa ılık ya da sıcak sıvılar tüketiniz.</li> <li>• Kepek, sebzeler, tam buğday ekmeği ve meyve gibi lif açısından zengin besinler tüketiniz. Diyetinize laksatif olarak etki gösteren erik ya da erik suyu ilave ediniz.</li> <li>• Egzersiz, bağırsaklarınızın yumuşamasına yardımcı olabilir.</li> <li>• Küçük, sık öğünlerle ve yumuşak gıdalarla – muz, pilav, elma püresi ve kızarmış ekmeği gibi – besleniniz.</li> <li>• Yiyecek kokusundan rahatsız olmamak için soğuk ya da oda sıcaklığındaki besinleri tüketiniz.</li> <li>• Kızarmış, baharatlı ya da yağlı yiyeceklerden kaçınınız.</li> <li>• Yavaş yavaş yiyip içiniz.</li> <li>• Gün içinde bol sıvı tüketiniz, ancak şişkinliği önlemek için öğünler sırasında sıvı tüketmeyiniz.</li> <li>• Üç ana öğün yerine günde altı ila sekiz küçük öğün ya da atıştırma öğünleri yemeye çalışınız.</li> <li>• Diyetinizi değiştiriniz ve yeni besinler ve tarifler deneyiniz.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doktorunuz bir dışkı yumuşatıcı önerebilir.</li> <li>• Bulantı ve kusmanın azalmasına yardımcı olacak bir ilaç kullanacaksınız.</li> <li>• Pişen yemek kokusunu en düşük düzeye indirmek için yemeklerinizi önceden pişirerek, bunları küçük porsiyonlar halinde dondurunuz.</li> <li>• Yemek için başkalarından yardım alınız, ancak yemekleri dondurulabilecek küçük porsiyonlar halinde hazırlamalarını isteyiniz. Ve onlara hangi besinlerden kaçınacaklarını söylemekten çekinmeyiniz.</li> <li>• Lezzeti değiştirmek için hafifçe baharat ekleyiniz.</li> <li>• Evlere Yemek Servisi gibi size yemek getirecek bir program kullanmanız yararlı olabilir.</li> <li>• Doktorunuz kemoterapi dozunuzu azaltabilir ya da bir sonraki kemoterapiyi erteleyebilir.</li> <li>• Kırmızı kan hücresi sayınızı arttıracak bir ilaç kullanabilirsiniz.</li> <li>• Doktorunuz kemoterapi dozunuzu azaltabilir ya da bir sonraki kemoterapiyi erteleyebilir.</li> <li>• Beyaz kan hücresi sayınızı arttıracak bir ilaç kullanabilirsiniz.</li> </ul>

Potansiyel Yan Etkiler	Yan Etkileri En Düşük Düzeye İndirme Yöntemi	Olası Tedaviler
<p><b>Alopesi ya da Saç Dökülmesi (Yaygın)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saç fırçasınızda, duşta ya da uyku sonrası yastığınızda normalden fazla miktarda dökülmüş saç bulunması</li> <li>Vücut tüylerinin dökülmesi</li> </ul> <p><b>Enfeksiyon (Az Yaygın)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ateş ve üşüme</li> <li>İdrara çıkma sırasında ağrı</li> <li>Boğaz ağrısı ve öksürük</li> <li>Burun tıkanıklığı</li> <li>Yara yerinde deride şişme ya da kızarma</li> </ul> <p><b>İshal (Az Yaygın)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Günde birkaç kez yumuşak ya da sulu dışkılama</li> <li>Karında kramplar, gaz ve şişkinlik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mümkün olduğunda, yemekten önce yürüyüş yapınız. Bu, kendinizi daha aç hissetmenizi sağlayabilir.</li> <li>Arkadaşlarınız ya da ailenizle birlikte yemek yiyiniz. Yalnız yediğinizde, radyo dinleyiniz ya da TV izleyiniz.</li> <li>Soğuk ya da aşırı sıcaktan kaçınmaya çalışınız.</li> <li>Tek parmaklı ya da normal eldiven, çorap ve atkı kullanınız.</li> <li>Parmaklarınız hissizse, keskin objeler konusunda dikkatli davranınız.</li> <li>Sıcak kahve fincanları, demlik ve tavalarda ve bulaşık suyuna dikkat ediniz – yanıcaya kadar sıcaklığı hissetmeyebilirsiniz.</li> <li>Kendinizi dengersiz hissediyorsanız, merdivenlerde ve duşta dikkatli davranınız.</li> <li>Gün içinde dinlenme saatleri planlayınız.</li> <li>Günlük aktivitelerinizi, enerjinizi koruyacak şekilde düzenleyiniz.</li> <li>İyi dengelenmiş bir diyetle beslenmeye ve bol sıvı tüketmeye çalışınız.</li> <li>Baş dönmesini önlemek için yavaşça ayağa kalkınız.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enfeksiyonu tedavi etmek ya da önlemek için bir antibiyotik kullanabilirsiniz.</li> <li>Doktorunuz kemoterapi dozunuzu azaltabilir ya da bir sonraki kemoterapiyi erteleyebilir.</li> <li>Her gün sekiz ila on bardak berrak sıvı tüketiniz.</li> <li>Doktorunuz ishal tedavisine yardımcı olacak bir ilaç reçete edebilir.</li> <li>Ağrının giderilmesine yardımcı olacak bir ilaç kullanabilirsiniz.</li> <li>Mantar enfeksiyonlarının ya da viral enfeksiyonların tedavisi için bir ilaç kullanabilirsiniz.</li> <li>Trombosit sayınızı arttıran bir ilaç kullanabilirsiniz.</li> <li>Doktorunuz kemoterapi dozunuzu azaltabilir ya da bir sonraki kemoterapiyi erteleyebilir.</li> </ul>

Potansiyel Yan Etkiler	Yan Etkileri En Düşük Düzeye İndirme Yöntemi	Olası Tedaviler
<p><b>Kabızlık (Yaygın)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dışkı geçişinde güçlük</li> <li>• Normal bağırsak hareketi sıklığında azalma</li> <li>• Küçük, sert, kuru dışkı</li> <li>• Şişkinlik, gaz, kramplar ve ağrı</li> </ul> <p><b>Bulantı/Kusma (Yaygın)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Midede bulantı ya da rahatsızlık hissi</li> </ul> <p><b>Anoreksi ya da İştah Kaybı (Yaygın)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• İştahın olmaması</li> <li>• Yemeği fazlasıyla iğrenç bulma</li> <li>• Metalik ya da ilaca benzer tat</li> <li>• Bazı besinlerden hoşlanmamanın neden olduğu tat değişikliği</li> </ul> <p><b>Nöropati (Yaygın)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eller ya da ayaklarda hissizlik ya da karıncalanma hissi</li> <li>• Kas krampları</li> <li>• Denge kaybı</li> <li>• Düğmelere basma ya da objeleri kaldırma güçlüğü</li> <li>• El ve ayak parmağı uçlarının sıcak ya da soğuğu ayırt etme yeteneğinde azalma</li> <li>• İşitme güçlüğü</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yumuşak bir saç fırçası kullanınız. Yuvarlak saç fırçası kullanmayınız, saçınızı boyatmayınız ya da perma yaptırmayınız.</li> <li>• Her gün saç yıkamaktan kaçınınız, hafif bir şampuan kullanınız ve saç kurutma makinesi kullanmaktan kaçınınız ya da kullanmak zorundaysanız düşük bir derecede çalıştırınız.</li> <li>• Saçınızı kısa kestiriniz; bu, saçınızın daha dolgun görünmesini sağlayacaktır.</li> <li>• Sigortanız bir peruğu kapsıyor olabilir. Bir peruk istiyorsanız, doktorunuzdan bir “saç protezi” reçete etmesini isteyiniz. Peruk alışverişini çok fazla saç kaybetmeden önce yaparsanız, saç renginiz ve şekliniz, kendi saçınıza daha uygun olabilir.</li> <li>• Başınızı güneşten korumak için güneş losyonu kullanınız ya da bir şapka veya eşarp takınız.</li> <li>• Ellerinizi sık sık yıkayınız.</li> <li>• Dişlerinizi her gün fırçalayınız ve diş ipi kullanınız.</li> <li>• Kesikleri hemen sıcak su, sabun ve antiseptikle temizleyiniz.</li> </ul>	

Potansiyel Yan Etkiler	Yan Etkileri En Düşük Düzeye İndirme Yöntemi	Olası Tedaviler
<p><b>Anemi (Yaygın)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yorgunluk ya da güçsüzlük</li> <li>• Baş dönmesi</li> <li>• Soluk cilt rengi</li> <li>• Soluksuz kalma hissi</li> <li>• Üşüme hissi</li> <li>•</li> </ul> <p><b>Alopesi ya da Saç Dökülmesi (Yaygın)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saç fırçanızda, duşta ya da uyku sonrası yastığınızda normalden fazla miktarda dökülmüş saç bulunması</li> <li>• Vücut tüylerinin dökülmesi</li> </ul> <p><b>Enfeksiyon (Az Yaygın)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ateş ve üşüme</li> <li>• İdrara çıkma sırasında ağrı</li> <li>• Boğaz ağrısı ve öksürük</li> <li>• Burun tıkanıklığı</li> <li>• Yara yerinde deride şişme ya da kızarma</li> </ul> <p><b>İshal (Az Yaygın)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Günde birkaç kez yumuşak ya da sulu dışkılama</li> <li>• Karında kramplar, gaz ve şişkinlik</li> </ul> <p><b>Ağız Yaraları ve Ağrı (Az Yaygın)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ağız, dil ve boğazda ağrı, şişme ve kızarıklık</li> <li>• “Paslı dil”</li> <li>• Konuşma, yutkunma ya da yemek yeme güçlüğü</li> <li>• Kanayan ülserler ve enfeksiyon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellerinizi sık sık yıkayınız.</li> <li>• Dişlerinizi her gün fırçalayınız ve diş ipi kullanınız.</li> <li>• Kesikleri hemen sıcak su, sabun ve antiseptikle temizleyiniz.</li> <li>• Beyaz kan hücresi sayınız düşük olduğunda, kalabalık yerlerden ve soğuk algınlığı ya da diğer hastalıkların bulunduğu kişilerden uzak durunuz.</li> <li>• Küçük, sık öğünlerle ve yumuşak gıdalarla – muz, pilav, elma püresi ve kızarmış ekmek gibi – besleniniz.</li> <li>• Kafein; alkol; çiğ sebze ve meyve; çiğ yumurta; az pişmiş et; baharatlı ve yağlı yemekler; süt ve süt ürünleri; fasulye ve diğer baklagiller gibi gaz yapan besinler; bol lifli ve fazla miktarda yağ içeren besinler; iki saatten uzun süre soğutucunun dışında kalmış yiyecekler (yumurta içeren yemekler ve krema ya da mayonez bazlı yiyecekler için bir saat); kitle oluşturan laksatifler ve dışkı yumuşatıcılardan kaçınınız.</li> <li>• Sert kıllı bir fırça ve florürlü diş macunu kullanarak, dişlerinizi günde iki ila dört kez fırçalayınız.</li> </ul>	

Potansiyel Yan Etkiler	Yan Etkileri En Düşük Düzeye İndirme Yöntemi	Olası Tedaviler
<p><b>Kanama (Nadir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Olağan dışı kanama, kolayca morarma</li> <li>• Siyah ya da katrana benzer renkte dışkı</li> <li>• İdrarda kan</li> <li>• Deride iğne ucu şeklinde kırmızı lekeler</li> <li>• Diş etlerinde kanama ya da burun kanamaları</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Her gün mumlu olmayan bir diş ipi kullanınız.</li> <li>• Doktorunuzdan, alkol içermeyen bir ağız gargarası önermesini isteyiniz.</li> <li>• Ağızınızı nemli tutmak için gün boyunca su yudumlayınız ve şekersiz tatlandırıcı şeker ya da sakız kullanınız.</li> <li>• Besinleri soğuk olarak ya da oda sıcaklığında tüketiniz.</li> <li>• Yumuşak ya da püre haline getirilmiş besinler tüketiniz.</li> <li>• Asitli, baharatlı, tuzlu, kızarmış ekmek gibi kuru ya da pütürlü besinlerden kaçınınız.</li> <li>• Aspirinden ve ibuprofen gibi aspirin benzeri ilaçlardan kaçınınız.</li> <li>• Tıraş bıçakları ve tırnak makası gibi keskin objeleri dikkatle kullanınız.</li> <li>• Kesikler, darbeler ve çürüklere neden olabilecek aktivitelerden kaçınınız.</li> </ul>	

## Başka Olası Yan Etkiler Var Mı?

Aşağıdaki tabloda, butedaviyle saptanan ilave yan etkiler sıralanmaktadır. Listede olası tüm yan etkiler yer almamaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için doktorunuzla görüşünüz.

Yaygın Yan Etkiler	Az Yaygın Yan Etkiler	Nadir Yan Etkiler
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deride renk değişikliği</li> <li>• Tırnak yataklarının kararması</li> <li>• Kadınlarda adet dönemlerinin durması ya da erken menopoz</li> <li>• İştah artışı ya da kilo alma</li> <li>• Ayak bileklerinde ya da ayaklarda şişme veya sıvı toplanması</li> <li>• Sinirlilik ya da huzursuzluk</li> <li>• Uykusuzluk</li> <li>• Bulanık ya da çift görme</li> <li>• Göz kapaklarında sarkma</li> <li>• Baş ağrısı</li> <li>• Güçsüzlük</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Burun akıntısı, konjesyon ya da aksırma</li> <li>• Bitkinlik</li> <li>• Gözde tahriş, enfeksiyonlar, glokom ya da katarakt</li> <li>• Geçici tat değişiklikleri</li> <li>• Kişilik değişiklikleri ya da duygudurum değişiklikleri</li> <li>• Baş dönmesi ya da bayılma hissi</li> <li>• Sık, ağrılı ya da güç idrara çıkma</li> <li>• Susama artışı</li> <li>• Şişkinlik</li> <li>• Ciltte döküntü</li> <li>• Boğazda tahriş</li> <li>• Abdominal ağrı</li> <li>• Kas ve eklem ağrısı</li> <li>• Düşük ya da yüksek kan basıncı</li> <li>• Nefes darlığı</li> <li>• Yüksek kan şekeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalp ya da akciğer sorunları</li> <li>• Akciğer dokusunda nedbeleşme</li> <li>• Sekonder kanser ya da lösemi</li> <li>• Ağır depresyon</li> <li>• Halüsinasyonlar</li> <li>• Kalp yetmezliği</li> <li>• Kızarma</li> <li>• Abdominal ağrı</li> </ul>

## Başka Olası Yan Etkiler Var Mı?

Aşağıdaki tabloda, bu tedaviyle saptanan ilave yan etkiler sıralanmaktadır. Listede olası tüm yan etkiler yer almamaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için doktorunuzla görüşünüz.

## Doktorumla Ne Zaman İletişime Geçmeliyim?

Aşağıdaki semptomlardan herhangi biri ortaya çıktığında, doktorunuzla iletişim kurunuz:

- Şiddetli ya da birkaç saat süren kusma
- Günde fazladan dört bağırsak hareketine neden olan ishal, bir günden uzun süren ishal, gece saatlerindeki ishal ya da ateş, kramplar veya kanlı dışkıyla seyreden ishal
- Titreyerek üşüme ya da 38°C'den yüksek ateş
- Ağrılı ya da sık idrara çıkma veya idrarda kan
- Olağan dışı kanama, kolayca morarma ya da deride iğne ucu şeklinde kırmızı lekeler
- Yemek yiyememe ya da kilo kaybı
- Düzensiz ya da hızlı kalp atışı
- Göğüs ağrısı, göğüs sıkışması ya da nefes darlığı
- Baş dönmesi ya da baygınlık hissi
- Ağızınız ya da boğazınızda yemek yemeyi engelleyen ağrı, kızarıklık, şişme veya yaralar
- Kabızlık
- Görmenin azalması, bulanık ya da çift görme
- Kanlı dışkılama, karın ağrısı ya da yanma
- Deride ağrılı yaralar, ülserler, kabarcıklar ya da soyulma

**Adres :** Atatürk Bulvarı 169/40 Bakanlıklar Ankara

**Tel :** 0-312-4257952

**web :** [www.hematoloji.org.tr](http://www.hematoloji.org.tr)  
: [www.kanhastaliklari.net](http://www.kanhastaliklari.net)

**e-mail :** [bilgi@hematoloji.org.tr](mailto:bilgi@hematoloji.org.tr)

